



Boletín Fitosanitario



ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Programa Granos
Informe de Fitopatología

Enfermedades de fin de ciclo y roya de la soja

Período informado: 22 al 28 de marzo de 2018.



Mildiu
(*Peronospora manshurica*)



Mancha marrón
(*Septoria glycines*)



Mancha anillada
(*Corynespora cassiicola*)



Mancha ojo de rana
(*Cercospora sojina*)



Tizón de la hoja
(*Cercospora kikuchii*)



Tizón bacteriano
(*Pseudomonas savastanoi*
pv. glycinea)



Mancha necrótica



Roya de la soja

Localidades relevadas

- Taruca Pampa, Burruyacu
- El Azul, Burruyacu
- La Cruz, Burruyacu
- El Palomar, Cruz Alta
- Piedrablanca, V.B.Aróz
- La Cocha, La Cocha

Enfermedad	Taruca Pampa, Burruyacu Estadio Fenológico: R6	El Azul, Burruyacu Estadio Fenológico: R5.5	La Cruz, Burruyacu Estadio Fenológico: R5	El Palomar, Cruz Alta Estadio Fenológico: R5	Piedrablanca, V.B.Aróz Estadio Fenológico: R5	La Cocha, La Cocha Estadio Fenológico: R5 y R6
Tizón de la hoja por Cercospora	Incidencia: 70%, Severidad: 25%	Incidencia: 30%, Severidad: 5%	Incidencia: 30%, Severidad: 5%	Incidencia: 30%, Severidad: 10%	Incidencia: 30%, Severidad: 20%	-
Mancha anillada	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 50%, Severidad: 10%	Incidencia: 90%, Severidad: 30%	Incidencia: 90%, Severidad: 10%	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 70%, Severidad: 20%
Mildiu	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 70%, Severidad: 10%	Incidencia: 70%, Severidad: 1%	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 80%, Severidad: 40%	Incidencia: 80%, Severidad: 30%
Mancha marrón	Incidencia: 70%, Severidad: 10%	Incidencia: 20%, Severidad: 10%	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 90%, Severidad: 35%	Incidencia: 30%, Severidad: 5%
Mancha Ojo de Rana	-	-	-	-	-	Incidencia: 70%, Severidad: 5%
Tizón bacteriano	-	Incidencia: 70%, Severidad: 20%	Incidencia: 40%, Severidad: 10%	-	-	-
Podredumbre carbonosa	-	-	-	-	-	-
Síndrome de la muerte súbita	-	Incidencia: 15%, Severidad: 70%	-	Incidencia: 25%, Severidad: 70%	-	-
Podredumbre húmeda del tallo	-	-	-	-	Incidencia: 20%	-

Comentario

Se observó la presencia de roya de la soja en Gral. Mosconi, provincia de Salta con valores de incidencia del 30 al 60% y severidad de 10 al 30%. No se detectó roya en las muestras analizadas pertenecientes a la provincia de Tucumán.