



Boletín Fitosanitario



ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Programa Granos
Informe de Fitopatología

Enfermedades de fin de ciclo y roya de la soja

Período informado: 12 al 21 de marzo de 2018.



Mildiu
(*Peronospora manshurica*)



Mancha marrón
(*Septoria glycines*)



Mancha anillada
(*Corynespora cassiicola*)



Mancha ojo de rana
(*Cercospora sojina*)



Tizón de la hoja
(*Cercospora kikuchii*)



Tizón bacteriano
(*Pseudomonas savastanoi*
pv. glycinea)



Mancha necrótica



Roya de la soja

Localidades relevadas

- Taruca Pampa, Burruyacu
- El Azul, Burruyacu
- La Cruz, Burruyacu
- El Palomar, Cruz Alta
- Piedrablanca, V.B.Aróz
- La Cocha, La Cocha

Localidad	Taruca Pampa, Burruyacu Estadio Fenológico: R6	El Azul, Burruyacu Estadio Fenológico: R5	La Cruz, Burruyacu Estadio Fenológico: R4-5	El Palomar, Cruz Alta Estadio Fenológico: R3	Piedrablanca, V.B.Aráo Estadio Fenológico: R3	La Cocha, La Cocha Estadio Fenológico: R4-5
Enfermedad						
Tizón de la hoja por Cercospora	Incidencia: 70%, Severidad: 25%	Incidencia: 2%, Severidad: 1%	Incidencia: 30%, Severidad: 5%	Incidencia: 30%, Severidad: 10%	Incidencia: 5%, Severidad: 2%	-
Mancha anillada	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 30%, Severidad: 10%	Incidencia: 90%, Severidad: 30%	Incidencia: 90%, Severidad: 10%	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 70%, Severidad: 15%
Mildiu	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 70%, Severidad: 10%	Incidencia: 70%, Severidad: 1%	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 80%, Severidad: 40%	Incidencia: 80%, Severidad: 20%
Mancha marrón	Incidencia: 70%, Severidad: 10%	Incidencia: 20%, Severidad: 10%	Incidencia: 80%, Severidad: 30%	Incidencia: 90%, Severidad: 25%	Incidencia: 90%, Severidad: 30%	Incidencia: 30%, Severidad: 5%
Mancha Ojo de Rana	-	-	-	-	-	Incidencia: 70%, Severidad: 5%
Tizón bacteriano	-	Incidencia: 70%, Severidad: 20%	Incidencia: 40%, Severidad: 1%	-	-	-
Podredumbre carbonosa	Incidencia: 1%	-	-	-	-	-
Síndrome de la muerte súbita	-	Incidencia: 5%, Severidad: 70%	-	Incidencia: 5%, Severidad: 70%	-	-
Podredumbre húmeda del tallo	-	-	-	-	Incidencia: 5%	-

Comentario

Se observó la presencia de roya de la soja en Gral. Mosconi, provincia de Salta con valores de incidencia del 10 al 30% y severidad de 1 al 3%. No se detectó en las muestras analizadas pertenecientes a la provincia de Tucumán.

Se recomienda monitorear los lotes de soja y consultar las condiciones ambientales del periodo en www.eeaoc.org.ar/agromet